

# HIVATALOS VÉDEKEZÉSI FELHÍVÁS 2026/II.

## A VÉDEKEZÉS ELVÉGZÉSE MINDEN TERMELŐ SZÁMÁRA KÖTELEZŐ!

### 1. INDOKLÁS

Az amerikai szőlőkabóca L5-ös lárvája megjelenése 2026. 07.06. napján megkezdődött. A kártevő terjeszti a szőlő aranyszínű sárgaság betegségét okozó (FD) fitoplazmát, mely betegség gyógyíthatatlan. A védekezés célja a térségi védekezések összehangolásával a járvány megfékezése.

Bővebb információ az FD-ről és az amerikai szőlőkabócáról az alábbi linken érhető el:  
<https://portal.nebih.gov.hu/fd-betegseg>

### 2. JOGSZABÁLYI ALAP ÉS SZANKCIÓK

Az (EU) 2016/2031 rendelet, a 2008. évi XLVI. törvény és a 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet jogszabályi előírásaival összhangban az amerikai szőlőkabóca elleni védekezés kötelező. A kezeléseket a közzétett védekezési felhívásokban meghatározott időzítés figyelembevételével szükséges elvégezni. A védekezés elmulasztása növényvédelmi bírságot, a támogatások megvonását vagy az ültetvény kivágását vonhatja maga után.

### 3. VÉDEKEZÉSI IDŐSZAK ÉS ÜTEMEZÉS

| Stádium | Optimális időpont    | Művelet       |
|---------|----------------------|---------------|
| Imágó   | július 22-július 29. | 2. Permetezés |

### 4. ENGEDÉLYEZETT SZEREK

Részletes lista az 1. sz. mellékletben vagy az alábbi linken:

<https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/1504431079/Engedelyezett+rovarolo+szerek.pdf>

A növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV.23.) FVM rendelet 30. §-a szerinti nyilvántartás vezetésére kötelezett termelőknek a kezelést a permetezési naplóban a munkavégzést követő 24 órán belül kell rögzíteniük.

Jelen esetben ajánlott a növényvédelmi kezelés elvégzését a elektronikus felületen is rögzíteni 48 órán belül a vissza ellenőrizhetőség érdekében.

### 5. HASZNOS TUDNIVALÓK A HATÉKONYSÁGÉRT

- Permetlé fedettsége: Ügyeljen a teljes lombfelület és a levelek fonákának megfelelő permetborítására.
- Szerfelhasználás: Javasolt legalább egy alkalommal felszívódó készítményt alkalmazni a tartós hatás érdekében.
- Bővebb információ és technológiai segédlet:

#### KONVENCIONÁLIS

[Amerikai szőlőkabóca - Integrált növényvédelmi technológia összefoglalása](#)

#### ÖKOLÓGIAI MŰVELÉS

[Az aranyszínű sárgaság és az amerikai szőlőkabóca elleni védekezés ajánlott technológiája ökológiai művelésben - Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet](#)

### 6. HATÓSÁGI SZEMÉLYEK, NÖVÉNYORVOSOK ÉS HEGBÍRÓK ELÉRHETŐSÉGE

Bővebb információért forduljon bizalommal a hatósághoz vagy a hegybíróhoz:

- FVKH Növény-és Talajvédelmi Osztály, telefon: +3622589217; +3622589216
- Frey Szabolcs hegybíró, telefon: +36-30/2844478
- Nagy Gábor hegybíró; telefon: +36-30/4075308
- Auerbachné Farkas Zsuzsanna hegybíró, telefon: +36-70/4508573
- Balaskó Noémi hegybíró, telefon: +36-70/4898684

Velence, 2026. július 07.

**A Fejér Vármegyei Kormányhivatal, mint növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró szerv (továbbiakban: élelmiszerlánc-felügyeleti szerv) a szőlő aranyszínű sárgaság betegséget okozó fitoplazma (*Grapevine flavescence dorée phytoplasma*) zárlati károsítót terjesztő amerikai szőlőkabóca ellen az alábbi 2026. évre vonatkozó a második védekezési felhívást teszi közzé a Móri és az Etyek-Budai borvidék összes szőlő területen Fejér vármegyei részének vonatkozásában:**

## **VÉDEKEZÉSI FELHÍVÁS 2026/II.**

Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv és a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara Fejér Vármegyei Területi Szervezete 2026. évben is folyamatosan vizsgálja a Fejér vármegyei szőlőterületeket az amerikai szőlőkabóca (*Scaphoideus titanus*) egyedfejlődését és egyedszámának alakulását. A 2026. július 06-án elvégzett felmérés szerint egyes szőlőültetvényekben még megtalálhatóak voltak a kabóca utolsó (L<sub>5</sub>) lárvastádiumú egyedei, ami azt jelenti, hogy feltehetőleg július utolsó dekádjára az összes egyed már teljesen kifejlődik repülésre is képes imágóvá. Emellett a vizsgálati eredmények azt mutatják, hogy a korábbi évek hasonló időszakához képest a kihelyezett sárgalapok kevesebb kifejlett alakot fogtak. A felhagyott illetve hagyományos ültetvényben még a védekezési küszöb környéki, az ökológiai ültetvényben már jóval az védekezési küszöb feletti egyedszámban. Ezt támasztják alá a csapdázási pontokon elvégzett hálózások eredményei is, mely szerint egyes ökológiai művelésben részesített szőlőültetvényekben növényenként legalább 1-2 db L5-ös lárva volt megtalálható.

**A vizsgálatok eredményei alapján, a következő kötelező védekezést július 22-július 29-e között szükséges elvégezni valamennyi szőlőtermő területen.**

Az ökológiai ültetvényekben a nagyobb egyedszám miatt a védekezést már a megadott periódus elején ajánlott végrehajtani.

Fontos hangsúlyozni, hogy a növényvédő szerek kijuttatása önmagában nem elegendő, a hatékonyságukat ellenőrizni is kell, és szükség esetén – valamint a további esetleges betelepülések miatt – a kezelés megismétlése válhat indokolttá. Ezért elengedhetetlen a kártevő népségének a megfigyelése. A szaporítóanyag előállító területeken legalább 3 színcsapdát (sárga ragacslap) kell kihelyezni hektáronként. Termő ültetvényekben az ajánlott sűrűség 5 ha-os táblaméretig 3 csapda/ha, 5–10 ha összefüggő táblaméretig 2 csapda/ha, és 10 ha feletti összefüggő táblaméret esetén 30 csapda/ültetvény. Hetente egy alkalommal szükséges a csapdafogást leolvasni, illetve a lombozaton az imágók jelenlétét megfigyelni. A fogások alapján alacsony a kifejlett alakok populációsűrűsége, ha a fogott egyedek száma átlagosan 4 egyed/csapda/10 nap, közepes, amennyiben 4–15 egyed/csapda/10 nap a fogás és magas, ha a csapdázott imágók száma nagyobb, mint 15 egyed/csapda/10 nap.

Fontos, hogy a fitoplazmát terjesztő **amerikai szőlőkabóca repülésre képes imágója át tudja vinni a fertőzött tőkéről egészséges tőkére a kórokozót táblán belül és táblák között is.**

**Szaporítóanyag-előállító területek**

A szaporítóanyag-előállító területeken – ideértve a törzsültetvényeket és faiskolákat – a védekezés kötelező, függetlenül attól, hogy az adott területen észleltek-e kabócát.

### **Alkalmazható készítmények és technológiák**

A védekezésre a felhívás 1. sz. mellékletének (Nébih honlapján elérhető [Szőlőben kabócafajok ellen engedélyezett rovarölő szerek](#)) táblázatában szereplő rovarölő szerek alkalmazhatók.

Az ökológiai szőlőültetvények esetében az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet által elkészített védekezési technológia [itt](#) érhető el.

A konvencionális szőlőültetvények esetében a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara által elkészített védekezési technológia [itt](#) érhető el.

Lényeges, hogy a kezelések során olyan növényvédő szereket használjon a szőlőtermelő, amelyek a kijuttatás fenostádiumában még engedélyezettek, az élelmezés-egészségügyi várakozási idő pedig betartható legyen, valamint az engedélyokirat által előírt növényvédelmi technológia (lásd 1. sz. melléklet) pedig nem zárja ki a kifejelett alak elleni alkalmazásukat.

**Mivel a táblázat a növényvédő szerek jelen felhívás kiadásának napján hatályos engedélyokiratai alapján készült, ezért az engedélyokiratokban történt módosításokat a készítmény felhasználása előtt ellenőrizni szükséges!**

Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv tájékoztatja a **Pyregard** rovarölő szer felhasználását tervezőket, hogy a készítmény felhasználása csak a területen szerződött növényvédelmi szakirányító által kitöltött, és az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által jóváhagyott adatlappal lehetséges.

### **Rezisztenciakezelés és technológiai tervezés**

Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv felhívja a termelők figyelmét arra, hogy az integrált növényvédelem alapelveinek betartása érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a rezisztencia kialakulásának megelőzésére.

Ennek érdekében:

- a készítmények engedélyokiratában meghatározott maximális kezelésszámot tilos túl lépni,
- a hatóanyagok kiválasztását (rotációját) és alkalmazását tudatosan kell megtervezni,
- valamint a későbbi kezelésekhez olyan készítményeket kell tartalékolni, amelyek az adott fenológiai állapotban még kijuttathatók és élelmezés-egészségügyi várakozási idejük is betartható.

### **AKG és ÖKO támogatásokhoz kapcsolódó kötelezettség**

A szőlő arany színű sárgaság terjedésének megakadályozása érdekében:

- a KAP-RD19a-1-24 kódszámú „Agrár-környezetgazdálkodási kifizetések” (AKG),
- valamint a KAP-RD20a-1-24 kódszámú „Ökológiai gazdálkodás támogatása” (ÖKO)

pályázati felhívások keretében támogatott szőlőültetvényekben évente legalább két alkalommal kötelező növényvédőszeres védekezést végezni az amerikai szőlőkabóca ellen.

A levelek sodródása és a levéllemezek elszíneződése megkezdődött, valamint a virágzatok elszáradása már megtörtént, egyes fajtáknál a bogyók töppedése is megindult. **A vonatkozó jogszabályok szerint a tünetes szőlő növények azonosítását követően, annak bejelentése kötelező az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv részére.**

A hatékony védekezés feltétele, hogy valamennyi szőlőterületen - ideértve az árutermelő ültetvényeket és a házikerti szőlőket is - védekezzenek a hatósági felhívások figyelembevételével, és ne veszélyeztessen a szomszédos termelők növényvédelmi, növényegészségügyi biztonságát a védekezés elmulasztásával.

A növényvédőszeres védekezéshez felhasználható készítmények listáját a felhívás *1. sz. melléklete* ([Szőlőben kabócafajok ellen engedélyezett rovarölő szerek](#)) tartalmazza.

A kiadmányozási jog gyakorlása a Fejér Vármegyei Kormányhivatal vezetőjének a kiadmányozásról szóló 19/2024. (XI. 21.) utasítása alapján történt.

Velence, időbélyegző szerint

A főispán helyett eljáró **Buday Attila** főigazgató  
nevében és megbízásából:

Vörösné Klupács Helga  
osztályvezető

Kapják:

1. Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara Fejér Vármegyei Szervezete (elektronikusan)
2. Móri Hegyközség (elektronikusan)
3. Etyek-Budai Hegyközség (elektronikusan)
4. Észak-Tolnai Hegyközség (elektronikusan)
5. Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növényvédelmi Igazgatósága (ni@nebih.gov.hu)
6. Hegyközségek Nemzeti Tanácsa (hnt@hnt.hu)

**1. sz. melléklet Szőlőben kabócafajok ellen engedélyezett rovarölő szerek**

Lezárva: 2026. június 11.

(Forrás: Növényvédő szerek adatbázisa, Nébih)

| Készítmény                                                                                                                           | Hatóanyag                                           | Forgalmi kategória | Legkisebb kiszerelés                         | A legkisebb kiszereléssel lekezelhető terület ** | A kezelések maximális száma egy tenyészidőszakban | Alkalmasság a lárvák és/vagy az imágók elleni védekezésre | Hatásmechanizmus |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Agrokén</b><br>ökológiai termesztésben is felhasználható                                                                          | poliszulfidkén, paraffinolaj, etoxilált zsíralkohol | III.               | 0,25; 0,5; 1; 5; 20; 50 kg; 1 m <sup>3</sup> | 50 m <sup>2</sup>                                | 2                                                 | tojás                                                     | kontakt          |
| <b>Decis</b>                                                                                                                         | deltametrin                                         | III.               | 5×3 ml<br>50 ml                              | 5×200 m <sup>2</sup><br>3333 m <sup>2</sup>      | 2                                                 | lárva, imágó                                              | kontakt          |
| <b>Decis Forte</b><br>(származtatott: Detector, Nuyard)                                                                              | deltametrin                                         | I.<br>II.          | ≥100 ml<br>50 ml                             | 1,3 ha<br>6666 m <sup>2</sup>                    | 2                                                 | lárva, imágó                                              | kontakt          |
| <b>Decis Mega</b>                                                                                                                    | deltametrin                                         | II.                | ≥100 ml                                      | 666 m <sup>2</sup>                               | 3                                                 | lárva, imágó                                              | kontakt          |
| <b>Exirel</b><br>(származtatott: Irazu)                                                                                              | ciántraniliprol                                     | I.<br>II.          | ≥200 ml<br>≥20 ml                            | 2222 m <sup>2</sup><br>220 m <sup>2</sup>        | 2                                                 | lárva                                                     | szisztémikus     |
| <b>Karate Zeon 5 CS</b><br>(származtatott: Full 5 CS, Kendo 5 CS, Ninja Zeon 5 CS);<br>(párhuzamos: Karate Zeon, Karate Zeon 050 CS) | lambda-cihalotrin                                   | II.<br>III.        | ≥200 ml<br>2,5; 5; 50 ml                     | 8000 m <sup>2</sup><br>100 m <sup>2</sup>        | 2                                                 | lárva, imágó                                              | kontakt          |
| <b>Klartan 24 EW</b><br>(származtatott: Mavrik 24 EW, Monospel 24 EW)                                                                | tau-fluvalinát                                      | I.<br>II.          | 0,2 l<br>3 ml                                | 6666 m <sup>2</sup><br>100 m <sup>2</sup>        | 2                                                 | lárva, imágó                                              | kontakt          |
| Készítmény                                                                                                                           | Hatóanyag                                           | Forgalmi kategória | Legkisebb kiszerelés                         | A legkisebb kiszereléssel lekezelhető terület ** | A kezelések maximális száma egy tenyészidőszakban | Alkalmasság a lárvák és/vagy az imágók elleni védekezésre | Hatásmechanizmus |
| <b>Lamdex Extra</b><br>(származtatott: Axiendo 2,5 WG, La-Cy Extra)                                                                  | lambda-cihalotrin                                   | III.               | 5; 50; 200 g; 1; 5 kg                        | 100 m <sup>2</sup>                               | 2                                                 | lárva, imágó                                              | kontakt          |
| <b>Laser</b><br>(származtatott: Nexsuba)<br>ökológiai termesztésben is felhasználható                                                | spinozad                                            | II.                | ≥500 ml                                      | 1,25 ha                                          | 2                                                 | lárva                                                     | kontakt          |

|                                                                                                                                                   |                                                        |                           |                                                                             |                                                         |                                                          |                                                                  |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Laser Duplo</b><br>ökológiai termesztésben is felhasználható                                                                                   | spinozad                                               | II.<br>III.               | ≥250 ml<br>2; 4; 5; 10; 20; 40; 100 ml                                      | 1,25 ha<br>100 m <sup>2</sup>                           | 2                                                        | lárva                                                            | kontakt                 |
| <b>Limocide</b><br>ökológiai termesztésben is felhasználható                                                                                      | narancsolaj                                            | II.                       | 1 l                                                                         | 1 ha                                                    | 6                                                        | lárva, imágó                                                     | kontakt                 |
| <b>Mospilan 20 SG *</b><br>(származtatott: Gazelle 20 SG *, Mospilan 20 SG Original *, Rafting *, Spilan 20 SG *);<br>(párhuzamos: Mospilan SG *) | acetamiprid                                            | I.<br>II.<br>III.         | ≥1 kg<br>100 g<br>4 g                                                       | 2,6 ha<br>2666 m <sup>2</sup><br>106 m <sup>2</sup>     | 1                                                        | lárva                                                            | szisztémikus            |
| <b>Nevikén</b><br>ökológiai termesztésben is felhasználható                                                                                       | poliszulfidkén,<br>paraffinolaj                        | III.                      | 0,25; 0,5; 1; 5; 10; 20;<br>1000 l                                          | 50 m <sup>2</sup>                                       | 2                                                        | tojás                                                            | kontakt                 |
| <b>Készítmény</b>                                                                                                                                 | <b>Hatóanyag</b>                                       | <b>Forgalmi kategória</b> | <b>Legkisebb kiszerelés</b>                                                 | <b>A legkisebb kiszereléssel lekezelhető terület **</b> | <b>A kezelések maximális száma egy tenyészidőszakban</b> | <b>Alkalmasság a lárvák és/vagy az imágók elleni védekezésre</b> | <b>Hatásmechanizmus</b> |
| <b>Nevikén Extra</b><br>ökológiai termesztésben is felhasználható                                                                                 | poliszulfidkén,<br>paraffinolaj                        | III.                      | 0,25; 0,5; 1; 5; 10; 20;<br>1000 l                                          | 50 m <sup>2</sup>                                       | 5                                                        | tojás                                                            | kontakt                 |
| <b>Olajos Rézkén</b><br>ökológiai termesztésben is felhasználható                                                                                 | poliszulfidkén,<br>paraffinolaj, etoxilált zsíralkohol | I.<br>III.                | ≥5 l<br>0,25; 0,5; 1 l                                                      | 830-1560 m <sup>2</sup><br>42-80 m <sup>2</sup>         | 2                                                        | tojás                                                            | kontakt                 |
| <b>Orogran</b><br>ökológiai termesztésben is felhasználható<br>(származtatott: Prev-Gold, Prev Gold Garden, Sinala)                               | narancsolaj                                            | II.<br>III.               | ≥1 l<br>30; 250; 500 ml                                                     | 1563 m <sup>2</sup><br>47 m <sup>2</sup>                | 6                                                        | lárva, imágó                                                     | kontakt                 |
| <b>Sanium System</b><br>(származtatott: Deltam System)                                                                                            | flupiradifuron                                         | II.<br>III.               | >500 ml<br>≤500 ml (4; 5; 6; 8; 10; 12; 50; 75; 100; 125; 250; 300; 500 ml) | 0,2 ha<br>10 m <sup>2</sup>                             | 1                                                        | lárva, imágó                                                     | szisztémikus            |
| <b>Sivanto Prime</b><br>(párhuzamos: Sivanto Prime 200 SL)                                                                                        | flupiradifuron                                         | I.<br>II.                 | 200 l<br>50 ml                                                              | 500 ha<br>1000 m <sup>2</sup>                           | 1                                                        | lárva, imágó                                                     | szisztémikus            |
| <b>Sivanto Energy</b><br>(párhuzamos: Sivanto Energy 85 EC)                                                                                       | deltametrin+flupiradifuron                             | I.                        | ≥250 ml                                                                     | 6250 m <sup>2</sup>                                     | 2                                                        | lárva, imágó                                                     | kontakt és szisztémikus |
| <b>Sumi Alfa 5 EC</b>                                                                                                                             | eszfenvalerát                                          | I.                        | ≥0,25 l                                                                     | 8333 m <sup>2</sup>                                     | 2                                                        | lárva, imágó                                                     | kontakt                 |

|                                                                                                         |                           |      |                                 |                    |   |              |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|---------------------------------|--------------------|---|--------------|---------|
| <b>Sumi Alfa 5 EW</b><br>(származtatott: Sumicidin 5 EW)                                                | eszfenvalerát             | I.   | ≥5 ml                           | 166 m <sup>2</sup> | 2 | lárva, imágó | kontakt |
| <b>Vegarep EC</b><br>(származtatott: Dripp Extra, Gravity)<br>ökológiai termesztésben is felhasználható | napraforgó olaj + lecitin | III. | 0,1; 0,2; 0,5; 1; 5; 20; 1000 l | 33 m <sup>2</sup>  | 3 | tojás alak   | kontakt |

*\* az acetamiprid hatóanyagú készítmények 2025.08.19-től csak szőlő alanytelepen használhatók fel*

*\*\* dózistartomány esetén a magasabb dózissal számolva*

**Megjegyzés: a készítmények felhasználása minden esetben az engedélyokirat előírásai szerint történjen.**

## Szőlőben kabócafajok ellen szükséghelyzeti felhasználásra engedélyezett rovarölő szerek

Lezárva: 2026. április 22.

(Forrás: Növényvédő szerek adatbázisa, Nébih)

| Készítmény                                                                                                            | Hatóanyag      | Forgalmi kategória | Legkisebb kiszerelés          | A legkisebb kiszereléssel lekezelhető terület ** | A kezelések maximális száma egy tenyészidőszakban | Alkalmasság a lárvák és/vagy az imágók elleni védekezésre | Hatásmechanizmus             | Kijuttatási időszak         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| <b>NeemAzal-T/S</b><br>ökológiai<br>termesztésben is<br>felhasználható                                                | azadirachtin A | II.<br>III.        | ≥2,5 l<br>25; 50; 100 ml; 1 l | 8333 m <sup>2</sup><br>83 m <sup>2</sup>         | 2                                                 | lárva, imágó                                              | nem ismert<br>(IRAC MoA: UN) | 2026.05.11.-<br>2026.09.07. |
| <b>Aza</b><br>ökológiai<br>termesztésben is<br>felhasználható                                                         | azadirachtin A | II.                | ≥150 ml                       | 500 m <sup>2</sup>                               | 2                                                 | lárva, imágó                                              | nem ismert<br>(IRAC MoA: UN) | 2026.05.11.-<br>2026.09.07. |
| <b>Pyregard</b><br>ökológiai<br>termesztésben is<br>felhasználható                                                    | piretrin       | I.                 | 1 l                           | 1,3 ha                                           | 2                                                 | lárva, imágó                                              | kontakt                      | 2026.03.16.-<br>2026.07.13. |
| <b>Carnadine</b><br>(származtatott:<br>Roslix, Silentium);<br>(párhuzamos:<br>Carnadine,<br>Carnadine 200,<br>Roslix) | acetamiprid    | I.<br>II.          | ≥150 ml<br>≥2 ml              | 8571 m <sup>2</sup><br>114 m <sup>2</sup>        | 1                                                 | lárva                                                     | szisztemikus                 | 2026.04.21.-<br>2026.08.18. |

**\*\* dózistartomány esetén a magasabb dózissal számolva**

**Megjegyzés: a készítmények felhasználása minden esetben a szükséghelyzeti engedélyokirat előírásai szerint történjen.**